Set

PHYSIOLogical TECHNOLOGY

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES: [CFP 1 (C)(I)(b)(i)] SOLUCIÓN DE ABONO MINERAL (Ca) (12) CON MICRONUTRIENTES

CONTENIDOS DECLARADOS:

12,0 % p/p ..... Óxido de calcio (CaO) soluble en agua
1,0 % p/p ..... Boro (B) soluble en agua

Nitrógeno (N) o pentóxido de fósforo (P_2O_5) superior al 0,5 % en masa:

0,85 % p/p..... Nitrógeno (N)

LISTA DE INGREDIENTES:

Gluconato cálcico[1] (CAS: 299-28-5), Ácido bórico[1] (CAS: 10043-35-3).
[1]Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Set es un fertilizante líquido que aporta calcio y boro, elementos fundamentales para el cuajado y el correcto desarrollo fisiológico de los frutos. La **Tecnología Stoller** presente en la formulación del producto proporciona una nutrición adecuada para intervenir de forma natural en los procesos fisiológicos de las plantas.

INSTRUCCIONES Y DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo		Aplicación foliar	Dosis óptima	Dosis min - máx (L/ha)	Volumen tratamiento (L)	Momento de aplicación	Frecuencia
Arables	Trigo, cebada, centeno, triticale...	✓	1,00 %	300-600	3-5	Antes de la hoja bandera BBCH 31-39 (Z31-Z39)	1-2 aplicaciones cada 15-30 días
	Maíz, girasol					Inicio de la floración y a lo largo del cuajado (BBCH 51-69)	
Oleaginosas y leguminosas	Soja, colza, guisante, alubia	✓	0,43 %	700-1000			
Hortícolas de fruto	Protegido	✓				Entre la inflorescencia y la cosecha	5-12 aplicaciones cada 7-15 días
	Extensivo						2-6 aplicaciones cada 15-30 días
Hortícolas de hoja	Protegido	✓				Desde las primeras hojas	5-12 aplicaciones cada 7-15 días
	Extensivo						
Tubérculos		✓				Durante la formación de tubérculos y hasta la cosecha	
Bulbos		✓				Durante la formación de bulbos y hasta la cosecha	
Hortícolas de raíz		✓				Durante la formación de raíces y hasta la cosecha	
Frutales	Frutales de hueso, frutales de pepita	✓	0,30 %	1000-1500		Desde la caída de los pétalos y durante los siguientes 50 días	2-6 aplicaciones cada 15-30 días
	Tropical, caqui, granada		0,15 %	2000-2500			
	Frutos de cáscara					Desde la caída de los pétalos de la inflorescencia femenina y durante los siguientes 50 días	
Plantones		✓	0,30 %	700-1000	2-3	Desde la brotación y hasta la apertura de la hoja	
Cítricos		✓	0,12 %	2500-3000	3-5	Desde la caída de los pétalos y durante los siguientes 50 días	
Olivar		✓	0,15 %	2000-2500			
Vid	Uva de mesa	✓				Desde la caída de los pétalos y durante los siguientes 35 días	
	Uva de vinificación		0,60 %	500-700			
Frutos rojos		✓	0,43 %	700-1000		Desde el desarrollo vegetativo hasta la primera inflorescencia	2-6 aplicaciones cada 7-15 días
Fresa		✓				En desarrollo vegetativo y durante la inflorescencia	

Aplicación foliar · Aplicación fertirrigación · Tratamiento semilla · Tratamiento siembra · Dosis óptima · Dosis min - máx (L/ha) · Volumen tratamiento (L) · Vol. trat. (L) min - máx · Frecuencia

Ante cualquier duda, póngase en contacto con la empresa Stoller Europe, o con el distribuidor de la empresa Stoller Europe, o con su asesor técnico, para obtener recomendaciones más específicas.

Observaciones:

Se recomiendan aplicaciones foliares, con soluciones con pH ligeramente ácido. Se recomienda no mezclar el producto con otros fertilizantes que contengan fosfatos o sulfatos. No obstante, si se desea mezclar, es recomendable consultar previamente con su distribuidor o representante local. Estas dosis son orientativas y quedará a cargo del usuario aumentarlas o disminuirlas en función de las características del cultivo, siempre bajo el asesoramiento de un Técnico especialista. En cualquier caso, se recomienda hacer una pequeña prueba previa antes de usar el producto. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS:

Almacenar los envases entre 0 y 35 °C. Condiciones generales de almacenamiento: evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.
Clasificación del producto según el Reglamento (CE) No 1272/2008:

ATENCIÓN

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Indicaciones de peligro: H319: Provoca irritación ocular grave. **Consejos de prudencia: P264:** Lavarse concienzudamente tras la manipulación. **P280:** Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. **P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P337+P313:** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

UFI: 3160-A0MJ-D005-4U8H
Teléfono Centro Toxicológico: (+34) 91 562 04 20

OTRA INFORMACIÓN/INFORMACIÓN ADICIONAL:

Uso profesional

Advertencia:

Stoller Europe S.L.U. hace sus recomendaciones en función de su experiencia. Pueden intervenir numerosos factores no controlables (preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.), siendo responsabilidad del usuario los daños que puedan producirse.

Together we grow.

Este documento es una herramienta de consulta y solo puede ser utilizado como tal. La etiqueta apropiada del producto es la que se muestra en el envase y que fue impresa en el momento de la compra.

Fabricante:
STOLLER EUROPE, S.L.U.
A Stoller Group Company
Elche Parque Empresarial
C/ Max Planck, 1.
03203 Elche, Alicante (España)
(+34) 965 110 522
info@stollereurope.com
www.stollereurope.com

FORMA FÍSICA:	Líquido en solución
MASA NETA:	6,9 kg ℮
VOLUMEN NETO:	5 L ℮
NÚMERO DE LOTE:	