Harbest

PHYSIOLogical TECHNOLOGY

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES: [CFP 1 (C)(I)(b)(i)]
SOLUCIÓN DE ABONO MINERAL N (Ca) 15 (12)

CONTENIDOS DECLARADOS:

15,0 % p/p ..... Nitrógeno (N) total
15,0 % p/p ..... Nitrógeno (N) ureico
12,0 % p/p ..... Óxido de calcio (CaO) soluble en agua

LISTA DE INGREDIENTES:

Urea[1] (CAS: 57-13-6), Gluconato de calcio[1] (CAS: 299-28-5).
[1]Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Harbest es un fertilizante líquido que aporta nitrógeno y calcio en cereales y cultivos extensivos. Estos dos nutrientes aseguran el aporte nutricional necesario para el correcto desarrollo del cultivo. Gracias a la tecnología patentada de Stoller N-HIB el nitrógeno ureico presente en **Harbest** es de liberación controlada haciendo su absorción más eficiente.

INSTRUCCIONES Y DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo		Aplicación foliar	Dosis óptima	Dosis min - máx (L/ha)	Volumen tratamiento (L)	Momento de aplicación	Frecuencia
Arable	Trigo, triticale, cebada, centeno	✓	2,50 %	200-400	5-10	Desde el macollamiento (BBCH 14) hasta la madurez (BBCH 79)	1-3 aplicaciones cada 15-30 días
	Maíz, girasol	✓	1,00 %	500-700		Desde las primeras 3-4 hojas (BBCH 13-14) hasta la madurez (BBCH 79)	
Oleaginosas y leguminosas	Soja, colza, guisantes y alubias	✓	1,00 %	500-700			
Hortícolas de fruto, hortícolas de hoja, tubérculos, bulbos, hortícolas de raíz		✓	1,00 %	500-700			
Cultivos industriales	Algodón	✓	1,00 %	500-700			
Frutales	Frutal de hueso, frutal de pepita		0,50 %	1000-1500		Desde la brotación hasta la floración	1-2 aplicaciones cada 15-30 días
	Tropical	✓	0,34 %	1500-2000			
	Frutos de cáscara, granada		0,25 %	2000-2500			
Plantones		✓	0,70 %	700-1000			
Cítricos		✓	0,20 %	2500-3000			
Olivar		✓	0,25 %	2000-2500			
Vid	Uva de mesa	✓	0,70 %	700-1000			
	Uva de vinificación						
Frutos rojos		✓	1,00 %	500-700		Desde las primeras 3-4 hojas (BBCH 13-14) hasta la madurez (BBCH 79)	1-3 aplicaciones cada 15-30 días
Fresa		✓	1,00 %	500-700			

Aplicación foliar · Aplicación fertirrigación · Tratamiento semilla · Tratamiento siembra · Dosis óptima · Dosis min - máx (L/ha) · Volumen tratamiento (L) · Vol. trat. (L) min - máx · Frecuencia

Ante cualquier duda, póngase en contacto con la empresa Stoller Europe, o con el distribuidor de la empresa Stoller Europe, o con su asesor técnico, para obtener recomendaciones más específicas.

Observaciones:

Harbest debe aplicarse desde los primeros estados fenológicos tras la germinación. El producto está diseñado para ser aplicado en pulverizaciones foliares, mediante maquinaria destinada a tal efecto y que asegure una dispersión y deriva de gota suficiente para asegurar una aplicación homogénea y eficiente. El producto no debe mezclarse con otros abonos líquidos que contengan fósforo o azufre con la intención de evitar posibles precipitaciones insolubles. No obstante, ante cualquier mezcla, es recomendable consultar previamente con su distribuidor o representante local. Estas dosis son orientativas y quedará a cargo del usuario aumentarlas o disminuirlas en función de las características del cultivo y siempre bajo el asesoramiento de un técnico especialista. En cualquier caso, se recomienda hacer una pequeña prueba previa antes de usar el producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS:

Almacenar los envases entre 0 y 35 °C. Condiciones generales de almacenamiento: evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.
Clasificación del producto según el Reglamento (CE) No 1272/2008:

PELIGRO

Ácido bórico (CAS: 10043-35-3)

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Indicaciones de peligro: H319: Provoca irritación ocular grave. **H360FD:** Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. **Consejos de prudencia: P201:** Solicitar instrucciones especiales antes del uso. **P264:** Lavarse concienzudamente tras la manipulación. **P280:** Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. **P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P308+P313:** EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. **P501:** Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

Este abono contiene urea, que puede liberar amoniaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

UFI: 3E50-S0SS-700Q-GF62
Teléfono Centro Toxicológico: (+34) 91 562 04 20

OTRA INFORMACIÓN/INFORMACIÓN ADICIONAL:

Uso profesional

Advertencia:

Stoller Europe S.L.U. hace sus recomendaciones en función de su experiencia. Pueden intervenir numerosos factores no controlables (preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.), siendo responsabilidad del usuario los daños que puedan producirse.

Este documento es una herramienta de consulta y solo puede ser utilizado como tal. La etiqueta apropiada del producto es la que se muestra en el envase y que fue impresa en el momento de la compra.

Fabricante:
STOLLER EUROPE, S.L.U.
A Stoller Group Company
Elche Parque Empresarial
C/ Max Planck, 1.
03203 Elche, Alicante (España)
(+34) 965 110 522
info@stollereurope.com
www.stollereurope.com

FORMA FÍSICA:	Líquido en solución
MASA NETA:	6,7 kg ℮
VOLUMEN NETO:	5 L ℮
NÚMERO DE LOTE:	